

CRC



COLLAGEN RESEARCH CENTER

1-10-1 Kamikiyoto, Kiyose, Tokyo 204-0013, Japan
Tel+81-424-95-1995 Fax+81-424-95-1990

K51 抗タイプIIコラーゲン抗血清 コラーゲン技術研修会
500 μ l
保存 -70 $^{\circ}$ C (-20 $^{\circ}$ C可)
抗原 ウシ関節軟骨由来タイプIIコラーゲン
内容 ルイス系ラット由来抗血清
交叉 各種(ヒト、ウシ、ブタ、ニワトリ、ラット)II Cと交叉。
用途 受動型関節炎モデルの作製抗原に、関節炎モデルの血清抗体値測定の
陽性標準に。免疫組織染色他に。

関連製品

- ・K52 抗タイプIIコラーゲン(Mono) 20 μ l/由来抗原ニワトリ
- ・血清中抗II C抗体価の測定キット
「K71ヒト用」「K72ラット用」「K73マウス用」
- ・各種タイプIIコラーゲン
「K41液 K42末 ウシ由来」「K43末 ニワトリ由来」
ヒト、ブタ、ラット由来もあり
- ・コラーゲナーゼ(MMPs) 活性測定試薬
/医科歯科大永井教室のご指導で1981年世界で最初に製品化
「K11コラーゲノキットCLN100」「K21蛍光標識コラーゲン」
- ・「K77 タイプIIコラーゲン測定キット」

CRC



COLLAGEN RESEARCH CENTER

1-10-1 Kamikiyoto, Kiyose, Tokyo 204-0013, Japan
Tel+81-424-95-1995 Fax+81-424-95-1990

コスモ・バイオ（株）開発

2000 9 20

K51 抗タイプIIコラーゲン抗血清
説明書

K51 抗タイプIIコラーゲン抗血清 コラーゲン技術研修会

- 1 容量 500 u l
- 2 保存 -70 C (短期-20 C)
- 3 抗原 ウシ関節軟骨由来タイプIIコラーゲン
- 4 内容 抗血清 (ルイス系ラット由来)
防腐剤他の添加物無し
抗体価は1:2000 ELISA
- 5 交叉 各種 (ヒト、ウシ、ブタ、ニワトリ、マウス、ラット) の
タイプIIコラーゲンと交叉
- 6 用途 受動型関節炎モデルの作製抗原に、関節炎モデルの血清抗体価測定の
陽性標準に、免疫組織染色他に

関連製品

- ・ K52 抗タイプIIコラーゲン抗体 (mono) 20 u l / 由来抗原はニワトリ
- ・ 血清中抗II C抗体価の測定キット
「K71ヒト用」「K72ラット用」「K73マウス用」
- ・ 各種タイプIIコラーゲン / 世界で最初に製品化
「K41液 K42末 ウシ由来」他にニワトリ、ラット、ヒト、ブタ由来
- ・ 培養液中のタイプIIコラーゲン測定キット
「K77」
- ・ 培養液中のタイプIVコラーゲン測定キット
「K79H ヒト用」「K79L 動物用」
- ・ 世界で最初のコラゲナーゼ活性測定試薬 / 医科歯科大永井教授のご指導で1981年製品化
「K11コラゲノキットCLN100」
「K21 蛍光標識コラーゲン」